

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОМ РЕФЛЮКСЕ У ДЕТЕЙ

Жамшид Азаматович Шамсиев

2 -клиника Самаркандского государственного медицинского института,
Узбекистан

Эркин Суюнович Данияров

2 -клиника Самаркандского государственного медицинского института,
Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Среди детей и подростков пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) встречается в 1% случаев, доля билатерального рефлюкса составляет до 50,9% [1]. При этом в 50% случаев степень рефлюкса с разных сторон различна.

Ключевые слова: пузырно-мочеточниковый рефлюкс, эндоскопия, дети.

TREATMENT TACTICS FOR BLADDER-URETERAL REFLUX IN CHILDREN

Jamshid Azamatovich Shamsiev

2 -clinic of Samarkand State Medical Institute, Uzbekistan

Erkin Suyunovich Daniyarov

2 -clinic of Samarkand State Medical Institute, Uzbekistan

ABSTRACT

Among children and adolescents, vesicoureteral reflux (PMR) occurs in 1% of cases, the proportion of bilateral reflux is up to 50.9% [1]. At the same time, in 50% of cases, the degree of reflux from different sides is different.

Keywords: vesicoureteral reflux, endoscopy, children.